细小病毒



病毒概述：

病毒是寄居在动物细胞里的一种微小的传染源。病毒可感染多种有机体，包括人、动物、甚至细菌。病毒主要有遗传物质组成，病毒通过进入宿主细胞复制遗传物质以达到生长繁殖的目的。当病毒在宿主细胞繁殖到一定数量时，宿主细胞便死亡，这就是病毒感染症状的原因。由于病毒寄居在机体细胞内，所以病毒感染很难治疗，普通治疗方法,如抗生素是不能直接杀死病毒的。

细小病毒：

细小病毒是一种感染动物消化系统和免疫系统的病毒。细小病毒可感染多种哺乳动物，但在不同种类动物间不能相互传染，也不会在人和动物间传播。该病在幼犬比较常见，但未经免疫的成犬也会感染。该病毒可经粪便和土壤传播。病毒可通过患病动物的大便感染到土壤，当其它动物接触到这些带病毒的土壤后可能被传染。细小病毒的生命力很强，可在宿主体外成活3个月以上。感染细小病毒的动物必须严格隔离，患畜接触并污染的区域必须消毒，可用漂白剂兑水以1：30比例的溶液进行消毒10分钟。

症状：

最常见的症状有呕吐、腹泻、倦怠、食欲废绝、饮水减少。病犬很快会脱水、营养不良，所以对细小病毒病尽早治疗尤为重要。

诊断：

病犬排泄物经特殊测试盘即可诊断是否有细小病毒。是否患有细小病毒病还须专业兽医结合血检和临床症状进行确诊，所以找一个经验丰富的执业兽医是很重要的。另外，须确认医院用的是高质量的IDEXX细小病毒测试盒，北京新天地国际动物医院使用IDEXX细小病毒测试盒，并且结合动物临床症状及病史来对该病进行诊断。

治疗：

细小病毒，目前尚无特效药。主要采用支持治疗，包括输液防止脱水，抗生素对抗继发感染，止吐，镇痛，以及营养补给。再次强调一下，治疗的关键在于提高动物自身免疫力以对抗病毒。

预后：

细小病毒病对于幼犬和没打疫苗的犬非常危险甚至致命。不少病犬经准确诊断和及时有效的治疗得以成活。

预防：

细小病毒病可通过科学护理和注射疫苗来预防。对于幼犬，在注射疫苗前不要外出，远离其他犬，以免暴露和潜在感染。幼犬可在6至8周注射第一针细小病毒病疫苗，之后再注射两针疫苗，细小病毒病疫苗效果非常好，北京新天地国际动物医院的兽医会提供给您疫苗注射日程表，成犬每年仍需要注射一次细小病毒病疫苗。须在兽医的指导下进行免疫预防，这样才能保证您的宠物健康、安全。

本栏目文字内容归新天地国际动物医院公司所有，任何单位及个人未经许可，不得擅自转载使用