

给犬猫做绝育手术有哪些好处呢？以下几点值得注意：

雄性猫绝育后可减少出走求偶过程中打架的情形以及减少到处撒尿占地盘的现象，例如车祸，传染病（通过打斗或交配传播），或者以后得癌症等都会有危险。绝育后寿命也会更长些。

雌性猫绝育后会变得更会温顺可爱，因为它的精力再也不会一味地用在求偶上面。（未绝育的母猫几乎一直都处于发情状态，直到怀孕）。给母猫绝育同样能避免生殖系统的感染，病变，癌症及一些性传播疾病的风险，例如艾滋病等。

雄性狗绝育后同样能保持活力和友好，性格无明显改变。90%的公狗绝育后能消除外出求偶的习惯。
公狗的攻击性。60%的公狗绝育后能消除对其它
绝育后能消除撒尿占地盘的行为。50% 的公狗
70%
的公狗能消除爬跨行为。绝育手术不会改变公狗的活动水平和食欲。公狗绝育后一般不会发胖或活动减少。

雌性狗绝育后完全杜绝每隔八个月的一次发情，及有强烈的气味血样分泌物的产生。在第一次发情前做绝育手术，几乎可避免患乳腺癌的机会。

“绝育”和“去势”是宠物外科最常见的手术。有时也被称为“去势”和“阉割”。各自的医学学名分别为“绝育”“子宫卵巢摘除术”及“去势”“睾丸摘除术”。

“绝育术”是把（母）雌性宠物的整个生殖系统摘除，包括子宫、输卵管和卵巢都从腹中线同一个切口摘除。使用的都是可吸收缝线，无需拆线。术后需要几天时间（一般7-10天）恢复，这期间必须限制您宠物的活动（不能剧烈运动或跑跳）。

“去势术”是将（公）雄性宠物的睾丸通过阴囊上的切口进行摘除。阴囊皮肤的切口，有的需要缝合，有的不需要缝合。术后护理，最重要是保持伤口干净和干燥。对于公猫，术后必须限于室内（因为有的猫以前可能不是完全室内猫），而且术后3-5天，即在伤口愈合前，需要使用水晶猫砂。无论雄性猫狗在绝育手术后，仍需要

1
至
2
周与异性的隔离。除预防感染外，由于阴茎内仍有残存精液的存在，所以依然可使异性受孕。

最好的手术时机雌性为第一次发情期前，即5~7个月，其中5~6个月龄为最佳时机。雄性则较为简单，即5个月龄后均可实施手术。

绝育和去势手术可以帮助控制宠物数量的过度增长和减少流浪动物的数量。

更重要的是，绝育和去势手术能让您的宠物更长寿，更健康！

本栏目文字内容归新天地国际动物医院公司所有，任何单位及个人未经许可，不得擅自转载使用